

レジメン情報 (3040_レジメン名 FOLFIRI+RAM)

(1) 基本情報

レジメン番号	3040	レジメン名	FOLFIRI+RAM	申請診療科	腫瘍内科
がん種	大腸がん	サイクル数	-	インターバル日数	14
留意事項等	Hb:9g/dL、PLT:10 万/mm ³ 以上で開始、蛋白尿は 1+以下で開始				

(2) 薬剤情報

種別	名称	投与量	投与日	投与方法
Rp.1	生食シリンジ 10mL	10mL	d1.	穿刺時フラッシュ
Rp.2	アロキシ注 0.75mg/50mL	50mL	d1.	30分 点滴静注
	デキサート注	6.6mg		
	ネオレスタール注 10mg/1mL	10mg		
	ラニチジン注射液 50mg/2mL	50mg		
Rp.3	生理食塩液 50mL	50mL	d1	フラッシュ用
Rp.4	サイラムザ注	8mg/kg	d1	1時間 点滴静注
	生理食塩液 250mL	250mL		インラインフィルター使用
Rp.5	生理食塩液 50mL	50mL	d1	15分 点滴静注
Rp.6	5%ブドウ糖 200mL	200mL	d1	2時間 点滴静注
	レボホリナート点滴静注用	200 mg/m ²		
Rp.7	イリノテカン注	150 mg/m ²	d1	2時間 点滴静注
	5%ブドウ糖注 500mL	500mL		レボホリナートと同時投与
Rp.8	フルオロウラシル注 5-FU注	400mg/m ²	d1	全開 急速点滴静注
	5%ブドウ糖 100mL	100mL		
Rp.9	フルオロウラシル注 5-FU注	2400mg/m ²	d1	トレフューザーポンプで
	ヘパリンナトリウム注 5000 単位/5mL	5mL		46時間 持続点滴静注
	5%ブドウ糖 100mL	100mL		計 130mL となるように調製